

7. LESNÍ ŠKOLKA

Pracovní list 7.1 Druhová skladba lesů Moravskoslezských Beskyd – ŘEŠENÍ

Doplň vynechaná slova:

kůrovců

smrk

jedle

uplatnění

200 lety

V současné době je převažující dřevinou **smrk** se 76 procenty. Dalšími jsou buk s 22 % a jedle s 1 %. Méně zastoupené dřeviny jsou bříza, javor nebo modřín.

Kdysi však bylo druhové složení jiné. Zhruba před **200 lety** tvořil smrk jenom třetinu porostů, další třetina připadla na buk a zbylou třetinu zastupovala **jedle**. Původní porosty se dochovaly pouze na několika málo místech. Jedním z nich je například prales Mionší.

Od 18. století byl smrk vysazován masivně a záměrně, protože rychle rostl a jeho dřevo mělo největší hospodářské **uplatnění**. Dnes se postupně od pěstování smrku upouští a lesníci už vysazují více buk, jedli nebo javor a smrk se dává většinou do příměsi.

Smrkové dřevo má stále největší hospodářské využití, ale smrk je bohužel také mnohem více poškozován než jiné stromy. V teplých letních měsících mu hrozí největší nebezpečí od **kůrovců**.

Zdroje:

Literatura a elektronické zdroje

Anonymní, 2010: Proměna lesů Moravskoslezských Beskyd. Lesy České republiky, s. p. [online]. Posl. aktual.: 27. 5. 2010 [cit.: 16. 8. 2019]. Dostupné z: <https://lesy-cr.cz/casopis-clanek/promena-lesu-moravskoslezskych-beskyd/>.

Fotografie a ilustrace

Obr. 1 autor: Radim Martynek



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

